

Принятие лекарств для устранения туберкулезных палочек и лечения туберкулеза.

Туберкулезные палочки живучи. Для того чтобы от них избавиться, Вам следует принимать предписанные лекарства в течение многих месяцев.



Принимая лекарства, помните о следующем:

- Строго следуйте указаниям медицинского работника.
- Не забывайте принимать таблетки. Медицинский работник расскажет Вам о системе «Лечение под наблюдением (ЛПН)». ЛПН - это метод приема противотуберкулезных таблеток в присутствии медицинского работника. ЛПН может проводиться в выбранном вами месте и в удобное вам время. ЛПН упрощает процесс лечения.
- Не прекращайте курс лечения раньше назначенного срока. Даже если вы почувствовали себя лучше через несколько недель лечения, туберкулез может вернуться, и вы опять станете заражать других.
- Уведомите медицинского работника о любых других принимаемых Вами лекарствах, включая лекарства, витамины и гомеопатические средства, приобретаемые без рецепта.

В период принятия противотуберкулезных лекарств избегайте употребления пива, вин и ликеров.

Уведомите медицинского работника, если Вы беременны, кормите грудью или принимаете противозачаточные таблетки.

Уведомите медицинского работника о других имеющихся у Вас заболеваниях.

✓ Отметьте галочкой противотуберкулезные лекарства, которые Вы принимаете:

_____ Isoniazid (INH)

_____ Rifampin

_____ Pyrazinamide (PZA)

_____ Ethambutol

_____ Другое _____

_____ Другое _____


_____ Другое _____



Как правило, противотуберкулезные лекарства безопасны.

Немногие пациенты страдают побочными явлениями. Если Вы столкнулись с какими-либо из перечисленных ниже проблем, без замедления сообщите об этом Вашему медицинскому работнику лично или по телефону.

- ▶ Потеря аппетита
- ▶ Рвота
- ▶ Боль в желудке
- ▶ Тошнота
- ▶ Желтизна глаз или кожи
- ▶ Покалывание в пальцах рук или ног
- ▶ Покалывание или онемение в области рта
- ▶ Затуманивание или другие изменения зрения
- ▶ Головокружение
- ▶ Боль в суставах
- ▶ Повышенная температура на протяжении 3 и более дней
- ▶ Сыпь
- ▶ Повышенная склонность к кровотечениям
- ▶ Повышенная склонность к образованию синяков
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____



Если вы принимаете Rifampin, вы должны знать, что:

- ◆ Цвет мочи, слюны или слез может приобрести оранжевый оттенок.
- ◆ На мягких контактных линзах могут появиться пятна. Это может произойти *очень быстро!* Не носите мягкие контактные линзы пока принимаете Rifampin.
- ◆ Чувствительность кожи к солнцу может повыситься. Пользуйтесь солнцезащитным средством и не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей.
- ◆ Действенность некоторых противозачаточных средств может быть ослаблено принятием Rifampin. Женщинам, принимающим Rifampin, следует пользоваться дополнительными противозачаточными средствами, такими как презервативы.

Защитите себя, свою семью и друзей от туберкулеза. Закончите курс лечения!

С вопросами, пожалуйста, обращайтесь:



<http://www.vdh.state.va.us/epi/tb>



8 ноября 2002 г.

What You Should Know About Taking Tuberculosis Medicines (Russian)

Что следует знать о



принятии противотуберкулезных лекарств